

化学療法レジメンセット登録用紙

領域	消化器がん	ルート	リザーバー
適応	胆道・膵臓がん		
No(3桁)	020	CODE	001005001020
診療科	消化器内科	医師	畑中
セット名称	▼GC+Pembrolizumab【8サイクルまで】		
申請年月日	令和 6 年 6月5日		
緊急		通常	●

抗癌剤名称	手技	標準投与量
キイトルーダ	DIV	200 mg/body
シスプラチン	DIV	25 mg/m ²
ゲムシタビン	DIV	1000 mg/m ²

リザーバー	末梢	皮下	確認		
●			医師	看護師	薬剤師
投与時間			総液量 mL		
3 時間 40 分			Mg ²⁺ 8 mEq	K ⁺ mEq	

※CDDPは最大8サイクルまで。以降GEM+Pembrolizumabへ。

※Pembrolizumabは維持療法含め最大35サイクルまで

投与スケジュール: (投 休) or (投与間隔 21 日) 《 》 クール

投与順	Rp	Total時間入力																														
			投与時間	-1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
1	生食 50mL 手技: 静脈内 経路: プライミング用/フィルター使用	IV		●																						(●)						
2	キイトルーダ 200mg +生食 100mL 手技: 静脈内 経路: 希釈後8時間以内に投与終了する	30分 DIV		●																						(●)						
3	生食 50mL 手技: 静脈内 経路:	10分 DIV		●																						(●)						
4	硫酸Mg補正液 8mL +生食 500mL 手技: 静脈内 経路:	60分 DIV		●								●														(●)						
5	パロノセトロンバッグ 50mL +デキサート 9.9mg 手技: 静脈内 経路:	30分 DIV		●								●														(●)						
6	シスプラチン ()mg +生食 500mL 手技: 静脈内 経路:	60分 DIV		●								●														(●)						
7	ゲムシタビン ()mg +生食 100mL 手技: 静脈内 経路:	30分 DIV		●								●														(●)						
8	生食 50mL 手技: 静脈内 経路:	500mL/hr DIV		●								●														(●)						
9	ヘパリンNaロックシリンジ 1本 手技: 静脈内 経路:	IV		●								●														(●)						
10	手技: 経路:																															