化 学 療 法 レ ジ メ ン セ ッ ト 登 録 用 紙

領域	消化器がん	ルート	リザーバー
適応	胆道・膵臓がん		
No(3桁)	021	CODE	001005001021
診療科	消化器内科	医師	畑中
セット名称	▼GEM+Pembrolizumab【維持療法】		
申請年月日	令和 6 年 6月5日		
緊急		通常	●

抗癌剤名称	手技	標準投与量
キイトルーダ	DIV	200 mg/body
ゲムシタビン	DIV	1000 mg/㎡

リザーバー	末梢	皮下	確認 医師	確認 看護師	確認 薬剤師
●					

投与時間	総液量 mL	
1 時間 40 分	Mg^{2+} mEq	K^{+} mEq

※PembrolizumabはGC+Pembrolizumab含め最大35サイクルまで

投与スケジュール: (投 休) or (投与間隔 21 日)《 》 クール

投与順	Rp	投与時間	Total時間入力	□	☑	□	□	□	□	□	□	☑	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
				-1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
1	生食 50mL 手技:静脈内 経路:プライミング用/フィルター使用	IV			●																					(●)						
2	キイトルーダ 200mg +生食 100mL 手技:静脈内 経路:希釈後8時間以内に投与終了する	30分 DIV			●																					(●)						
3	生食 50mL 手技:静脈内 経路:経過観察	10分 DIV			●																					(●)						
4	デキサート 6.6mg +生食 50mL 手技:静脈内 経路:	30分 DIV			●							●														(●)						
5	ゲムシタビン ( )mg +生食 100mL 手技:静脈内 経路:	30分 DIV			●							●														(●)						
6	生食 50mL 手技:静脈内 経路:	500mL/hr DIV			●							●														(●)						
7	ヘパリンNaロックシリンジ 1本 手技:静脈内 経路:	IV			●							●														(●)						
8	手技: 経路:																															
9	手技: 経路:																															
10	手技: 経路:																															

レジメ検討委員会