化学療法レジメンセット登録用紙

領域	乳がん	ルート	リザーバー
適応	乳がん(ケモ)		
No(3桁)	003	CODE	002001001003
診療科	乳腺外科	医師	鈴木
セット名称	FEC100【APR併用】		
申請年月日	平成 21 年 7月7日		
緊急		通常	●

抗癌剤名称	手技	標準投与量
エンドキサン	DIV	500 mg/㎡
エピルビシン	DIV	100 mg/㎡
フルオロウラシル	DIV	500 mg/㎡

リザーバー	末梢	皮下	確認		
			医師	看護師	薬剤師
●					

投与時間	総液量 mL	
2 時間 30 分	Mg^{2+} mEq	K^{+} mEq

投与スケジュール: (投 休) or (投与間隔 21 日)《 》 クール

投与順	Rp	投与時間	-1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
		Total時間入力	□	☑	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
1	パロノセトロンバッグ 50mL +デキサート 9.9mg 手技:静脈内 経路:アプレピタント併用	30分 DIV		●																					(●)						
2	エピルビシン ( )mg +生食 50mL 手技:静脈内 経路:	15分以内 DIV		●																					(●)						
3	エンドキサン ( )mg +生食 250mL 手技:静脈内 経路:溶解後6hr以内に投与終了する	90分 DIV		●																					(●)						
4	フルオロウラシル ( )mg +生食 50mL 手技:静脈内 経路:	15分以内 DIV		●																					(●)						
5	生食 50mL 手技:静脈内 経路:	500mL/hr DIV		●																					(●)						
6	ヘパリンNaロックシリンジ 1本 手技:静脈内 経路:	IV		●																					(●)						
7	手技: 経路:																														
8	手技: 経路:																														
9	手技: 経路:																														
10	手技: 経路:																														