# 化 学 療 法 レ ジ メ ン セ ッ ト 登 録 用 紙



| 領域 | 乳がん | ルート | リザーバー |
|---|---|---|---|
| 適応 | 乳がん(ケモ) | | |
| No(3桁) | 021 | CODE | 002001001021 |
| 診療科 | 乳腺外科 | 医師 | 鈴木 |
| セット名称 | PTX | | |
| 申請年月日 | 平成 21 年 7月7日 | | |
| 緊急 | | 通常 | ● |

| 抗癌剤名称 | 手技 | 標準投与量 |
|---|---|---|
| パクリタキセル | DIV | 210 mg/㎡ |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

| リザーバー | 末梢 | 皮下 | 確認 医師 | 確認 看護師 | 確認 薬剤師 |
|---|---|---|---|---|---|
| ● | | | | | |

| 投与時間 | 総液量 mL | |
|---|---|---|
| 3 時間 30 分 | $Mg^{2+}$ mEq | $K^{+}$ mEq |

投与スケジュール: ( 投 休 ) or (投与間隔 21 日)《 》 クール

| 投与順 | Rp | 投与時間 | Total時間入力 | □ | ☑ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | -1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 1 | デキサート 19.8mg +ファモチジン 20mg<br>手技:静脈内 経路:フィルター使用/DEX減量しない | IV | | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ( ● ) | | | | | | |
| 2 | グラニセトロンバッグ 50mL<br>手技:静脈内 経路:レスタミンコーワ5錠服用 | 30分<br>DIV | | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ( ● ) | | | | | | |
| 3 | パクリタキセル ( )mg +5%ブドウ糖 500mL<br>手技:静脈内 経路: | 3時間<br>DIV | | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ( ● ) | | | | | | |
| 4 | 生食 50mL<br>手技:静脈内 経路: | 500mL/hr<br>DIV | | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ( ● ) | | | | | | |
| 5 | ヘパリンNaロックシリンジ 1本<br>手技:静脈内 経路: | IV | | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ( ● ) | | | | | | |
| 6 | 手技: 経路: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | 手技: 経路: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | 手技: 経路: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | 手技: 経路: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | 手技: 経路: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |