化 学 療 法 レ ジ メ ン セ ッ ト 登 録 用 紙

領域	乳がん	ルート	リザーバー
適応	乳がん(HER2陽性)		
No(3桁)	051	CODE	002001001051
診療科	乳腺外科	医師	鈴木
セット名称	4HER+PTX		
申請年月日	平成 27 年 1月22日		
緊急		通常	●

抗癌剤名称	手技	標準投与量
パクリタキセル	DIV	100 mg/㎡
トラスツズマブ	DIV	4 mg/kg
トラスツズマブ	DIV	2 mg/kg

リザーバー	末梢	皮下	確認 医師	確認 看護師	確認 薬剤師
●					

投与時間	総液量 mL	
2 時間 30 分	Mg^{2+} mEq	K^{+} mEq

投与スケジュール: (投 休) or (投与間隔 28 日)《 》 クール

投与順	Rp	投与時間	Total時間入力	-1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
1	デキサート 6.6mg +ファモチジン 20mg 手技:静脈内 経路:フィルター使用	IV			●							●							●												
2	グラニセトロンバッグ 50mL 手技:静脈内 経路:レスタミンコーワ服用	30分 DIV			●							●							●												
3	パクリタキセル ( )mg +生食 250mL 手技:静脈内 経路:	60分 DIV			●							●							●												
4	トラスツズマブ ( )mg +生食 250mL +注射用水 20mL 手技:静脈内 経路:	30-90分 DIV			●																										
5	生食 50mL 手技:静脈内 経路:プライミング用	IV																								●					
6	トラスツズマブ ( )mg +生食 250mL +注射用水 20mL 手技:静脈内 経路:	30-90分 DIV																								●					
7	生食 50mL 手技:静脈内 経路:	500mL/hr DIV			●							●							●							●					
8	ヘパリンNaロックシリンジ 1本 手技:静脈内 経路:	IV			●							●							●							●					
9	手技: 経路:																														
10	手技: 経路:																														

レジメ検討委員会