## 化学療法レジメンセット登録用紙

領域	乳がん	ルート	リザーバー								
適応	乳がん(TNBC)										
No(3桁)	055	CODE	002001001055								
診療科	乳腺外科	医師	鈴木								
セット名称	▼Pembrolizuma	ab+PTX+CB	DCA【APR併用】								
申請年月日	令和 4	4 年	10月17日								
緊急	•	通常									

抗癌剤名称	手技	標準	<b>準投</b> 与量
キイトルーダ	DIV	200	mg/body
パクリタキセル	DIV	80	mg/m <sup>2</sup>
カルボプラチン	AUC	5	AUC

リザー	ーバー	末	₹梢	J	支下	確認								
						医自	师	看	護師	薬剤師				
	投-	与時	間		総液	量			n	ıL				
3	時	間	10	分	Mg <sup>2+</sup>		mЕ	q	$K^{^{+}}$	mEq				

			投与スケジュール: ( 投								休	) (	or	(投与間		与間隔		1 日)		) «		ク	7—ル	7				
		Total時間入力		<b>V</b>						<b>√</b> [							<u> </u>											Ī
投与順	Rp	投与時間	-1	1 2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 1	5 1	3 17	18	19	20	21	22 2	23 24	4 25	26	27	28
I 1	生食 50mL 手技:静脈内 経路:プライミグ用/フィルター使用	IV	•	•																								
1 2	キイトルーダ 200mg +生食 100mL 手技:静脈内 経路:	30分 DIV		•																								
1 3	生食 50mL 手技:静脈内 経路:経過観察	10分 DIV		•																								
4	パロノセトロンバッグ 50mL +デキサート 6.6mg +ファモチジン 20mg 手技:静脈内 経路:レスタミンコーワ服用/アプレピタント併用	30分 DIV		•																		,						
5	グラニセトロンバッグ 50mL +デキサート 6.6mg +ファモチジン 20mg 手技:静脈内 経路:レスタミンコーワ服用	30分 DIV								•						•												
I 6	パクリタキセル ( )mg +5%ブドウ糖液 250mL 手技:静脈内 経路:	60分 DIV	,	•						•																		
1 7	カルボプラチン ( )mg +生食 250mL 手技:静脈内 経路:	60分 DIV		•																								
1 8	生食 50mL 手技:静脈内 経路:	500mL/hr DIV		•						•																		
1 9	ヘパリンNaロックシリンジ 1本 手技:静脈内 経路:	IV		•						•																		
10	手技: 経路:																											