化学療法レジメンセット登録用紙

領域	乳がん	ルート	リザーバー
適応	乳;	BC)	
No(3桁)	057	CODE	002001001057
診療科	乳腺外科	医師	鈴木
セット名称	▼Pembroliz	umab+E0	C【APR併用】
申請年月日	令和 4	4 年	10月17日
緊急	•	通常	

抗癌剤名称	手技	標準	準投 与量
キイトルーダ	DIV	200	mg/body
エピルビシン	DIV	90	mg/ m i
エンドキサン	DIV	600	mg/ m i

IJ	ザー	バー	ŧ	₹梢	J	支下	確認								
							医自	币	看	護師	薬剤師				
	投与時間 総液					量			n	٦L					
	2	時	間	25	分	Mg ²⁺		mЕ	q	K^{+}	mEq				

		投与スケジュール: (投									休)	or	· (投与間隔					日)《 》			ク	ー ル	,				
			Total時間入力		<u> </u>																		\prod	JE				司
投与順		Rp	投与時間	-1	1 2	3	4	5	6	7	8 9) 10) 11	12	13	14	15 1	3 17	18	19	20	21	22 2	23 24	25	26	27	28
1 1	生食 50mL 手技:静脈内	経路:プライミグ用/フィルター使用	IV																									
1 2	キイトルーダ 200m 手技:静脈内	g +生食 100mL 経路:	30分 DIV																			,						
1 3	生食 50mL 手技:静脈内	経路:経過観察	10分 DIV																									
1 4		50mL +デキサート 9.9mg 経路:アプレピタント併用	30分 DIV																			,	(•)					
I 5	エピルビシン (手技:静脈内)mg +生食 50mL 経路:	15分以内 DIV																									
I 6)mg +生食 250mL 経路:溶解後6hr以内に投与終了する	60分 DIV																			,						
1 7	生食 50mL 手技:静脈内	経路:	500mL/hr DIV							1												,	•					
1 8	へパリンNaロックシリ 手技:静脈内	Jンジ 1本 経路:	IV																				•					
9	手技:	経路:																										
10	手技:	経路:																										