化学療法レジメンセット登録用紙

領域	乳がん	ルート	リザーバー
適応	乳がん(TNBC)		
No(3桁)	060	CODE	002001001060
診療科	乳腺外科	医師	鈴木
セット名称	▼Pembrolizumab+GEM+CBDCA		
申請年月日	令和 4 年 10月17日		
緊急	●	通常	

抗癌剤名称	手技	標準投与量
キイトルーダ	DIV	200 mg/body
ゲムシタビン	DIV	1000 mg/㎡
カルボプラチン	AUC	2 AUC

リザーバー	末梢	皮下	確認		
			医師	看護師	薬剤師
●					

投与時間	総液量 mL	
2 時間 40 分	Mg^{2+} mEq	K^{+} mEq

投与スケジュール: (投 休) or (投与間隔 21 日)《 》 クール

投与順	Rp	投与時間	-1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
		Total時間入力	□	☑	□	□	□	□	□	□	☑	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
1	生食 50mL 手技:静脈内 経路:プライミグ用/フィルター使用	IV		●																					(●)						
2	キイトルーダ 200mg +生食 100mL 手技:静脈内 経路:	30分 DIV		●																					(●)						
3	生食 50mL 手技:静脈内 経路:経過観察	10分 DIV		●																					(●)						
4	グラニセトロンバッグ 50mL +デキサート 6.6mg 手技:静脈内 経路:★アプレピタント不要	30分 DIV		●							●														(●)						
5	ゲムシタビン ( )mg +生食 100mL 手技:静脈内 経路:	30分 DIV		●							●														(●)						
6	カルボプラチン ( )mg +生食 100mL 手技:静脈内 経路:ACU:2	60分 DIV		●							●														(●)						
7	生食 50mL 手技:静脈内 経路:	500mL/hr DIV		●							●														(●)						
8	ヘパリンNaロックシリンジ 1本 手技:静脈内 経路:	IV		●							●														(●)						
9	手技: 経路:																														
10	手技: 経路:																														