## 化学療法レジメンセット登録用紙

領域	乳がん	ルート	リザーバー
適応	乳	がん(TNI	BC)
No(3桁)	061	CODE	002001001061
診療科	乳腺外科	医師	鈴木
セット名称	▼Pembrol	izumab+F	PTX weekly
申請年月日	令和 "	4 年	10月17日
緊急	•	通常	

抗癌剤名称	手技	標準	<b>基投</b> 与量
キイトルーダ	DIV	200	mg/body
パクリタキセル	DIV	90	$mg/m^2$

リザー	バー	末	梢	J	支下			7	確認	
	,					医自	师	看	護師	薬剤師
	<i>'</i>									
	投 <i>与</i>	戼	間		総液	量			n	٦L
2	時	間	10	分	Mg <sup>2+</sup>		mЕ	q	K <sup>+</sup>	mEq

				扫	设与.	スク	rジ:	1-	ル	:	(			投			休	)	or	(投-	与間	隔	2	1	日)	<b>«</b>	,	<b>»</b>	クー	・ル
			Total時間入力		~							~							<b>√</b>						7			Ī	JE	$\prod$
投与順		Rp	投与時間	-1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15 1	16 17	7 18	19	20	21	22	23	24 2	25 2	6 2	7 28
1	生食 50mL				•																									
'	手技:静脈内	経路:プライミグ用/フィルター使用	IV																										$\perp$	
2	キイトルーダ 200m	g +生食 100mL	30分		•																									
2	手技:静脈内	経路:	DIV																										$\perp$	
3	生食 50mL		10分		•																									
3	手技:静脈内	経路:経過観察	DIV																											
4	グラニセトロンバッグ 50m	nL +デキサート 6.6mg +ファモチジン 20mg	30分																											
	手技:静脈内	経路:レスタミンコーワ服用	DIV																											
5	パクリタキセル(	)mg +生食 250mL	60分		•																									
J	手技:静脈内	経路:	DIV																										$\perp$	
6	生食 50mL		500mL/hr		•																									
	手技:静脈内	経路:	DIV																										$oldsymbol{\perp}$	
7	へパリンNaロックシ!	Jンジ 1本																												
,	手技:静脈内	経路:	IV																										$\perp$	
8																														
	手技:	経路:																										ᆚ	ᆚ	
9																														
	手技:	経路:									Ц				4													$\perp$	$\perp$	$\perp$
10																														
	手技:	経路:									- 1																			

## 化学療法レジメンセット登録用紙

領域	乳がん	ルート	リザーバー
適応	乳:	がん(TNI	3C)
No(3桁)	061	CODE	002001001061
診療科	乳腺外科	医師	鈴木
セット名称	▼Pembrol	izumab+F	PTX weekly
申請年月日	令和 '	4 年	10月17日
緊急	•	通常	

抗癌剤名称	手技	標準	<b></b> <b>性投</b> 与量
キイトルーダ	DIV	200	mg/body
パクリタキセル	DIV	90	$mg/m^2$

リザーバー	末梢	J	支下		i	確認	
				医師	看	護師	薬剤師
投	与時間		総液	星		n	ηL
2 時	間 10	分	Mg <sup>2+</sup>	m	Eq	K⁺	mEq

		_	招	设与	スケ	ァジ	<u> </u>	・ル	:	(			投			休	)	or	(投	り	間隔	<u> </u>	21		日)	«	y	<b>&gt;</b>	クー	・ル
		Total時間入力		<b>\</b>							<b>~</b>							<b>✓</b>										Ī	Ī	攌
投与順	Rp	投与時間	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52 5	3 5,	4 5	5 56
1	生食 50mL																												Τ	
'	手技:静脈内 経路:プライミグ用/フィルター使用	IV																												
2	キイトルーダ 200mg +生食 100mL	30分																•												
2	手技:静脈内 経路:	DIV																												
3	生食 50mL	10分																											Τ	
3	手技:静脈内 経路:経過観察	DIV																												
4	グラニセトロンバッグ 50mL +デキサート 6.6mg +ファモチジン 20mg	30分		•														•												
4	手技:静脈内 経路:レスタミンコーワ服用	DIV																												
5	パクリタキセル ( )mg +生食 250mL	60分																										Ī		
5	手技:静脈内 経路:	DIV																												
6	生食 50mL	500mL/hr																•												
0	手技:静脈内 経路:	DIV																												
7	ヘパリンNaロックシリンジ 1本																											Ī		
/	手技:静脈内 経路:	IV																												
0																														
8	手技: 経路:																													
9																														
9	手技: 経路:	_																												
10																														
	手技: 経路:																													

## 化学療法レジメンセット登録用紙

領域	乳がん	ルート	リザーバー
適応	乳:	がん(TNI	3C)
No(3桁)	061	CODE	002001001061
診療科	乳腺外科	医師	鈴木
セット名称	▼Pembrol	izumab+F	PTX weekly
申請年月日	令和 '	4 年	10月17日
緊急	•	通常	

抗癌剤名称	手技	標準	<b></b> <b>性投</b> 与量
キイトルーダ	DIV	200	mg/body
パクリタキセル	DIV	90	$mg/m^2$

末	梢	J.	支下			7	確認	
				医自	师	看	護師	薬剤師
与時	間		総液	量			rr	ηL
間	10	分	$Mg^{2+}$		mЕ	q	$K^{^{+}}$	mEq
	与時	- 末梢 - 末梢 - 与時間 - 持間 10	与時間	与時間 総液	与時間 総液量	与時間 総液量	与時間 総液量	与時間 総液量 r

				ŧ	ひ与 ス	スケ	ジュ	— JI	<b>/</b> :	(			投		1	休 )	0	r (	(投.	与間	隔	2	1	日)	<b>«</b>	)	» ·	クー	ル
			Total時間入力		7						<b>\</b>																Ī	JE	$\prod$
投与順		Rp	投与時間	56	57 5	58 5	9 6	0 61	62	63	64	65	66	67 6	68	39 7	0 7	1 72	2 7:	3 74	75	76	77	78	79	80 8	1 8:	2 83	84
1	生食 50mL																												
'	手技:静脈内	経路:プライミグ用/フィルター使用	IV																										
2	キイトルーダ 200m	g +生食 100mL	30分																										
2	手技:静脈内	経路:	DIV																										
3	生食 50mL		10分																										
3	手技:静脈内	経路:経過観察	DIV																										
4	グラニセトロンバッグ 50m	L +デキサート 6.6mg +ファモチジン 20mg	30分		•																								
4	手技:静脈内	経路:レスタミンコーワ服用	DIV																										
5	パクリタキセル(	)mg +生食 250mL	60分																										
5	手技:静脈内	経路:	DIV																										
6	生食 50mL		500mL/hr																										
0	手技:静脈内	経路:	DIV																										
7	ヘパリンNaロックシリ	シジ 1本																											
'	手技:静脈内	経路:	IV																										
8																													
0	手技:	経路:																											
9																													
9	手技:	経路:																											
10																													
10	手技:	経路:																											