化学療法レジメンセット登録用紙

領域	乳がん	ルート	リザーバー
適応	乳がん(TNBC)		
No(3桁)	062	CODE	002001001062
診療科	乳腺外科	医師	鈴木
セット名称	▼Pembrolizumab+nab-PTX weekly		
申請年月日	令和 4 年 10月17日		
緊急	●	通常	

抗癌剤名称	手技	標準投与量
キイトルーダ	DIV	200 mg/body
アブラキサン	DIV	100 mg/㎡

リザーバー	末梢	皮下	確認		
			医師	看護師	薬剤師
●					

投与時間	総液量 mL	
1 時間 40 分	Mg^{2+} mEq	K^{+} mEq

投与スケジュール: (投 休) or (投与間隔 84 日)《 》 クール

投与順	Rp	投与時間	-1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
		Total時間入力	☐	☑	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☑	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☑	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☑	☐	☐	☐	☐	☐	☐
1	生食 50mL 手技:静脈内 経路:プライミグ用/フィルター使用	IV		●																					●						
2	キイトルーダ 200mg +生食 100mL 手技:静脈内 経路:	30分 DIV		●																					●						
3	生食 50mL 手技:静脈内 経路:経過観察	10分 DIV		●																					●						
4	生食 50mL 手技:静脈内 経路:プライミング用/輸液セット交換	IV		●																											
5	デキサート 6.6mg +生食 50mL 手技:静脈内 経路:★フィルター不可	30分 DIV		●							●							●													
6	アブラキサン ( )mg +生食 100mL 手技:静脈内 経路:1VをNs20mLで溶解/空のNs容器使用	30分 DIV		●							●							●													
7	生食 50mL 手技:静脈内 経路:	500mL/hr DIV		●							●							●													
8	ヘパリンNaロックシリンジ 1本 手技:静脈内 経路:	IV		●							●							●							●						
9	手技: 経路:																														
10	手技: 経路:																														

化学療法レジメンセット登録用紙

領域	乳がん	ルート	リザーバー
適応	乳がん(TNBC)		
No(3桁)	062	CODE	002001001062
診療科	乳腺外科	医師	鈴木
セット名称	▼Pembrolizumab+nab-PTX weekly		
申請年月日	令和 4 年 10月17日		
緊急	●	通常	

抗癌剤名称	手技	標準投与量
キイトルーダ	DIV	200 mg/body
アブラキサン	DIV	100 mg/㎡

リザーバー	末梢	皮下	確認		
			医師	看護師	薬剤師
●					

投与時間	総液量 mL	
1 時間 40 分	Mg^{2+} mEq	K^{+} mEq

投与スケジュール: (投 休) or (投与間隔 84 日)《 》 クール

投与順	Rp	投与時間	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56
		Total時間入力	☐	☑	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☑	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☑	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
1	生食 50mL 手技:静脈内 経路:プライミグ用/フィルター使用	IV																●													
2	キイトルーダ 200mg +生食 100mL 手技:静脈内 経路:	30分 DIV																●													
3	生食 50mL 手技:静脈内 経路:経過観察	10分 DIV																●													
4	生食 50mL 手技:静脈内 経路:プライミング用/輸液セット交換	IV																●													
5	デキサート 6.6mg +生食 50mL 手技:静脈内 経路:★フィルター不可	30分 DIV		●							●							●													
6	アブラキサン ( )mg +生食 100mL 手技:静脈内 経路:1VをNs20mLで溶解/空のNs容器使用	30分 DIV		●							●							●													
7	生食 50mL 手技:静脈内 経路:	500mL/hr DIV		●							●							●													
8	ヘパリンNaロックシリンジ 1本 手技:静脈内 経路:	IV		●							●							●													
9	手技: 経路:																														
10	手技: 経路:																														

化学療法レジメンセット登録用紙

領域	乳がん	ルート	リザーバー
適応	乳がん(TNBC)		
No(3桁)	062	CODE	002001001062
診療科	乳腺外科	医師	鈴木
セット名称	▼Pembrolizumab+nab-PTX weekly		
申請年月日	令和 4 年 10月17日		
緊急	●	通常	

抗癌剤名称	手技	標準投与量
キイトルーダ	DIV	200 mg/body
アブラキサン	DIV	100 mg/㎡

リザーバー	末梢	皮下	確認		
			医師	看護師	薬剤師
●					

投与時間	総液量 mL	
1 時間 40 分	Mg^{2+} mEq	K^{+} mEq

投与スケジュール: (投 休) or (投与間隔 84 日)《 》 クール

投与順	Rp	投与時間	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84
		Total時間入力	☐	☑	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☑	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☑	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
1	生食 50mL 手技:静脈内 経路:プライミグ用/フィルター使用	IV									●																				
2	キイトルーダ 200mg +生食 100mL 手技:静脈内 経路:	30分 DIV									●																				
3	生食 50mL 手技:静脈内 経路:経過観察	10分 DIV									●																				
4	生食 50mL 手技:静脈内 経路:プライミング用/輸液セット交換	IV									●																				
5	デキサート 6.6mg +生食 50mL 手技:静脈内 経路:★フィルター不可	30分 DIV		●							●							●													
6	アブラキサン ( )mg +生食 100mL 手技:静脈内 経路:1VをNs20mLで溶解/空のNs容器使用	30分 DIV		●							●							●													
7	生食 50mL 手技:静脈内 経路:	500mL/hr DIV		●							●							●													
8	ヘパリンNaロックシリンジ 1本 手技:静脈内 経路:	IV		●							●							●													
9	手技: 経路:																														
10	手技: 経路:																														