化 学 療 法 レ ジ メ ン セ ッ ト 登 録 用 紙

領域	乳がん	ルート	リザーバー
適応	乳がん(HER2陽性)		
No(3桁)	066	CODE	002001001066
診療科	乳腺外科	医師	鈴木
セット名称	PTX+PHESGO【2回目以降】		
申請年月日	令和 6 年 2月9日		
緊急		通常	●

抗癌剤名称	手技	標準投与量
フェスゴ【MA】	S.C	2000 U/body
パクリタキセル	DIV	80 mg/㎡

リザーバー	末梢	皮下	確認		
			医師	看護師	薬剤師
●					

投与時間	総液量 mL	
1 時間 45 分	Mg^{2+} mEq	K^{+} mEq

投与スケジュール: (投 休) or (投与間隔 21 日)《 》 クール

投与順	Rp	投与時間	Total時間入力	□	☑	□	□	□	□	□	□	☑	□	□	□	□	□	□	☑	□	□	□	□	□	□	☑	□	□	□	□	□	□	□
				-1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
1	フェスゴMA 2000U 手技:皮下 経路:大腿部に5分以上かけて皮下注	5分以上 S.C			●																					(●)						
2	生食 50mL 手技:静脈内 経路:経過観察	15分 DIV			●																					(●)						
3	グラニセトロンバッグ 50mL +デキサート 6.6mg +ファモチジン 20mg 手技:静脈内 経路:レスタミンコーワ5錠/フィルター使用	30分 DIV			●							●							●							(●)						
4	パクリタキセル ( )mg +生食 250mL 手技:静脈内 経路:	60分 DIV			●							●							●							(●)						
5	生食 50mL 手技:静脈内 経路:	500mL/hr DIV			●							●							●							(●)						
6	ヘパリンNaロックシリンジ 1本 手技:静脈内 経路:	IV			●							●							●							(●)						
7	手技: 経路:																															
8	手技: 経路:																															
9	手技: 経路:																															
10	手技: 経路:																															